



# Condado de Santa Cruz

## AGENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

CAJA DE OFICINA POSTAL 962, 1080 Emeline Ave., SANTA CRUZ, CA 95061-0962

TELÉFONO: (831) 454-4000 FAX: (831) 454-4488 TDD: Call 711

### Comunicado de Prensa

**Para Divulgación:** Inmediata

**Fecha:** 5 de julio de 2023

**Contacto:** Corinne Hyland

(831) 566-4370

#### **Primera muerte por xilacina confirmada en el Condado de Santa Cruz**

*Funcionarios instan a tomar medidas para reducir las sobredosis, incluido el uso de naloxona en caso de sospecha de sobredosis, ya que la xilacina suele mezclarse con opioides*

**CONDADO DE SANTA CRUZ, Calif.** – La médica forense del condado de Santa Cruz confirmó el lunes la primera muerte por intoxicación de xilacina en el condado. La xilacina, también conocida como tranq, es un tranquilizante veterinario sin uso aprobado en humanos y cada vez se detecta más en los suministros de drogas en todo el país, lo que provoca sobredosis mortales y heridas graves.

Una mujer de 35 años fue encontrada inconsciente en Santa Cruz, murió a principios de junio y luego dio positiva por drogas que incluyen xilacina y fentanilo a través de la toxicología post mortem. La xilacina se agrega al fentanilo para extender los efectos eufóricos del opioide, a menudo sin el conocimiento de los usuarios.

“Este trágico evento es una alerta importante para la comunidad de que se ha confirmado la presencia de xilacina en las drogas en el condado de Santa Cruz”, dijo el Dr. David Ghilarducci, director médico del EMS del condado de Santa Cruz. “El fentanilo, solo, es extraordinariamente peligroso y está devastando comunidades en todo el país. La adición de xilacina agrava el riesgo de las drogas callejeras”.

Los informes de la administración federal para el control de drogas indican que la xilacina a veces se mezcla con opioides como el fentanilo y la heroína. Aunque la sobredosis de xilacina no se revierte con naloxona, este medicamento, que puede salvar vidas, debe administrarse a las personas que están experimentando una sobredosis para revertir el componente opioide de la sobredosis. La naloxona no dañaría a alguien bajo los efectos de la xilacina.

“El enfoque más seguro es evitar el uso de drogas callejeras si es posible. Afortunadamente, existen tratamientos efectivos disponibles para aquellos que son dependientes de los opioides”, dice el Dr. Ghilarducci.

La xilacina puede ralentizar el sistema nervioso y hacer que la respiración y el ritmo cardíaco sean más lentos. Si alguien no responde, llame al 911, administre naloxona y realice la respiración de rescate. Si hay xilacina presente, es posible que estén muy somnolientos incluso después de recibir naloxona.

Las pruebas de detección para esta droga aún no están disponibles en todas las salas de emergencias o centros de atención médica. El departamento de salud pública está alertando a los médicos locales sobre su creciente prevalencia en el suministro de drogas. La xilacina puede causar heridas. Consulte a un médico de inmediato si tiene una herida por el uso de xilacina, y manténgala limpia y cubierta para evitar infecciones.

La naloxona ha sido aprobada recientemente por el gobierno federal para su distribución sin receta en farmacias y está disponible de forma gratuita en muchos sitios comunitarios. Consulte <https://www.hipscc.org/naloxone> para obtener una lista de los sitios de distribución de naloxona. Las personas que están listas para buscar tratamiento para el uso de sustancias pueden comunicarse con su médico o llamar al centro de llamadas de Servicios de Salud Conductual del Condado de Santa Cruz al (800) 953-2335.